

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere” (Cat. D CCNL SSN)

PROVA SCRITTA DEL 24/01/2017 TEST B

- 1) I limiti dell'esercizio professionale dell'infermiere sono dati:
 - a) Dall'atto medico e dagli atti delle altre professioni sanitarie
 - b) Dai limiti delle sue conoscenze
 - c) Dal codice deontologico
 - d) Dal profilo professionale

- 2) Le scale visive analogiche (VAS) misurano:
 - a) Solo il dolore fisico
 - b) Le sensazioni che il paziente identifica come dolore
 - c) La paura e l'ansia legata al dolore
 - d) La capacità di astrazione del paziente

- 3) Quali delle seguenti non è una causa diretta di anemia:
 - a) Emorragia
 - b) Eccessiva emolisi
 - c) Gastrectomia totale
 - d) Scompenso cardiaco

- 4) Cos'è un evento sentinella?
 - a) Il riconoscimento che in qualcosa si è raggiunta l'eccellenza
 - b) Un segnale che avverte che si spende troppo
 - c) Il verificarsi di un fatto che rileva una criticità del sistema
 - d) Un segnale che avverte che è stato commesso un errore

- 5) Il consenso informato deve essere
 - a) Sempre espresso in forma scritta
 - b) Espresso in forma scritta e controfirmato da un testimone
 - c) Espresso in presenza di un parente
 - d) Orale, oppure scritto e firmato dal paziente

- 6) La distruzione di microorganismi patogeni e saprofiti, comprese le spore, è definita:
 - a) Detersione
 - b) Asepsi
 - c) Disinfezione
 - d) Sterilizzazione

- 7) La clearance della creatinina deve essere effettuata:
 - a) Su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
 - b) Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore
 - c) Solo su un campione di urine delle 24 ore
 - d) Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore

- 8) Tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica:
 - a) C.I.N.A.H.L.
 - b) Medline
 - c) Cochrane Library
 - d) Elsevier

- 9) Il risultato di un test che porta erroneamente ad accettare l'ipotesi sulla quale è stato condotto, si definisce:
- Falso negativo
 - Falso positivo
 - Ipotesi nulla
 - Errore campionario
- 10) Delle seguenti quale sarebbe la modalità migliore per studiare il rapporto tra massa corporea (BMI) e rischio di lesioni da decubito in una certa tipologia di pazienti:
- Sperimentazione di trattamento con analisi pre-post test
 - Studio di prevalenza trasversale con T Test
 - Studio caso-controllo e stima dell'Odds Ratio
 - Studio longitudinale secondario di coorte con indice di contingenza
- 11) Nelle artroprosi infette con fistola secernente è generalmente indicata:
- Terapia antibiotica
 - Rimozione della protesi
 - Rimozione della protesi e terapia antibiotica
 - Intensa fisioterapia
- 12) La "rivelazione del segreto professionale" prevede la sanzione su querela per:
- I professionisti sanitari ma non per chi esercita una professione
 - I professionisti e gli addetti all'assistenza oltre che ai tecnici sanitari
 - Tutti coloro che abbiano avuto le informazioni dato il loro ufficio
 - Chiunque diffonda un segreto senza giusta causa
- 13) Per la legge dello Stato, la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è:
- Consentita in ed extra ospedale al personale con formazione specifica
 - Riservata agli infermieri con medico presente
 - Attuabile da chiunque in base alla condizione ed al contesto
 - Attuabile solo dal personale sanitario laureato
- 14) Nelle fasi precoci di un'occlusione intestinale meccanica del colon, il quadro clinico è caratterizzato da:
- Vomito fecaloide
 - Dolori addominali di tipo crampiforme
 - Difesa addominale diffusa
 - Peristalsi assente
- 15) Quali dei seguenti fattori non rientra tra quelli di rischio di disfagia:
- Malattia di Alzheimer
 - Età avanzata
 - Ulcera gastrica
 - Intubazione prolungata
- 16) Quali tra le seguenti attività non rientra tra le attività attribuite all'infermiere:
- Educazione sanitaria
 - Prevenzione
 - Diagnosi
 - Riabilitazione

- 17) Il segno addominale di Blumberg è caratteristico di:
- Addome acuto
 - Appendicite acuta
 - Morbo di Crohn
 - Ulcera gastrica
- 18) Secondo la normativa la registrazione dell'ora di inizio dell'emotrasfusione e del numero di carico dell'unità da trasfondere deve essere effettuata:
- Dall'infermiere
 - Dal medico
 - Dal coordinatore
 - dall'O.S.S.
- 19) In che cosa consiste l'"accreditamento"?
- In una valutazione cui una struttura si sottopone volontariamente e periodicamente, rispetto a norme internazionali verificate da agenzie terze
 - In una autorizzazione a svolgere un servizio
 - In un atto amministrativo che riconosce ad una struttura di servizio la capacità di operare in base a standard di qualità predefiniti
 - In una valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso tariffario previsto dal sistema sanitario
- 20) Quale delle seguenti è la causa più frequente di embolia polmonare?
- Trombosi venosa profonda degli arti inferiori
 - Trombosi dell'atrio destro
 - Endocardite batterica
 - Emboli gassosi da focolai di fratture
- 21) Cosa si intende per comunicazione non verbale?
- L'insieme delle caratteristiche paralinguistiche, extralinguistiche, dei movimenti mimici facciali e i sistemi gestuale e prossemico
 - Unicamente il linguaggio scritto
 - L'insieme delle modalità con cui un individuo occupa lo spazio personale nell'interazione con altri
 - Il sistema delle configurazioni espressive che il volto umano può assumere per manifestare le emozioni
- 22) Il concetto di "Empowerment" nell'assistenza e nell'educazione del paziente si riconduce a:
- Atteggiamento di rifiuto del paziente nell'autogestione delle cure prescritte dal medico
 - Forte delega al paziente nella cura e autogestione della sua malattia
 - Forte responsabilizzazione degli operatori sanitari
 - Cooperazione reciproca e paritetica della persona che ha un problema di salute alla sua autogestione
- 23) In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è in genere:
- per bocca semisolida
 - enterale con sondino
 - per bocca idrica
 - parenterale centrale

- 24) Il contropulsatore aortico:
- E' un dispositivo che sostiene la circolazione in caso di bassa gittata
 - Migliora la perfusione arteriosa coronarica durante la diastole
 - Riduce il post carico durante la sistole
 - Tutte le risposte indicate
- 25) Identificare segni e sintomi dell'ipoglicemia:
- glicemia inferiore a 60 mg / ml, squilibri elettrolitici e confusione mentale
 - glicemia inferiore a 60 mg /ml, grave disidratazione e confusione mentale
 - tachicardia e sudorazione, glicemia inferiore a 60 mg / ml, cute pallida e fredda
 - glicemia inferiore ai 60 mg / ml, nervosismo ed irritabilità
- 26) Per audit clinico, nei sistemi di qualità, si intende
- Attività di consulenza e controllo ai fini della certificazione di una struttura sanitaria
 - Verifica da parte di pari, di processi e attività sulla base di standard predefiniti
 - Discussione interdisciplinare di un caso clinico problematico
 - Valutazione dei risultati di efficacia delle procedure cliniche
- 27) La scala Norton è utile per accertare:
- le reazioni al dolore nell'anziano con demenza
 - se il paziente è a rischio di confusione mentale
 - se il paziente ha lesioni da decubito
 - nessuna delle altre risposte
- 28) Il quadro clinico di un paziente mielodepresso si presenterà con:
- Neutropenia, anemia, diarrea
 - Trombocitopenia, neutropenia, anemia
 - Anemia, disfagia, xerostomia
 - Trombocitopenia, neutropenia, stipsi
- 29) Con la legge n. 42 del 1999 si modifica:
- La denominazione di professione ausiliaria, sostituita da professione sanitaria
 - L'assetto dell'assistenza sanitaria territoriale con l'istituzione dei consultori familiari
 - La formazione universitaria con l'istituzione di master universitari per le professioni sanitarie
 - La formazione universitaria con l'istituzione dei diplomi universitari per le professioni sanitarie.
- 30) Gli effetti tossici dell'eparina, legati a iperdosaggio, vengono neutralizzati dalla somministrazione di:
- acido aminocaproico
 - solfo di protamina
 - epinefrina
 - derivati dicumarolici
- 31) Qual è la periodicità, prevista dalla legge, del controllo sanitario per i turnisti con lavoro notturno?
- Ogni 5 anni
 - Ogni 4 anni
 - Ogni 2 anni
 - Ogni 3 anni

- 32) Considerando l'interazione possibile fra proteine e farmaci per quale fra le seguenti classi di farmaci è indicata la somministrazione lontano dai pasti:
- Calcioantagonisti
 - Antiparkinsoniani
 - Benzodiazepine
 - Cortisonici
- 33) Prima di somministrare la terapia attraverso il SNG l'infermiere :
- Valuta che il sondino sia pervio, valuta la possibilità di frantumare o aprire le capsule lava il sondino con 5 ml di acqua prima di somministrare
 - Valuta che il sondino sia posizionato correttamente, valuta la possibilità di frantumare o aprire le capsule , lava il sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione
 - Valuta che il sondino sia pervio, frantuma tutta la terapia e le diluisce in poca acqua, tiene chiuso il sondino per almeno 4 ore
 - Valuta che il sondino sia posizionato correttamente, frantuma la terapia e apre le capsule, lava il sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione
- 34) In base alla normativa l'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria quale ruolo ha nella terapia endovenosa continua:
- Può solo sorvegliare la terapia endovenosa in corso e riferire all'infermiere eventuali problemi
 - Può predisporre, preparare la fleboclisi perché è previsto dal profilo
 - Può applicare anche la terapia endovenosa continua, ma non prepararla
 - Può cambiare le fleboclisi se si tratta di soluzioni idratanti, senza farmaci aggiunti
- 35) Applicare a pazienti ricoverati misure di contenzione senza il loro consenso per evitare danni alla loro incolumità e a quella di altri ospiti mediante l'applicazione di spondine per il letto, può configurare:
- Lesioni personali
 - Maltrattamento
 - Violenza privata
 - Sequestro di persona
- 36) Evidenze in letteratura suggeriscono di utilizzare l'idratazione sottocutanea tramite l'ipodermoclisi allo scopo di:
- Prevenire o correggere la disidratazione lieve o moderata in pazienti anziani che non assumono liquidi per via orale
 - Correggere rapidamente grandi volumi di liquidi in pazienti disfagici con disidratazione
 - Correggere l'ipovolemia negli anziani ospiti di strutture residenziali
 - Garantire la somministrazione di supplementi nutrizionali in pazienti anziani con disfagia
- 37) Per spettro di un antibiotico si intende:
- La concentrazione di un antibiotico raggiungibile a livello ematico
 - L'insieme degli agenti patogeni resistenti all'azione di un antibiotico
 - L'insieme di antibiotici capaci di agire nei confronti di un dato agente patogeno
 - L'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
- 38) Nella frattura del collo del femore, l'arto si presenta:
- Extrarotato ed accorciato
 - Extrarotato ed allungato
 - Intrarotato ed allungato
 - Intrarotato ed accorciato

- 39) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
- Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
 - Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia, oliguria
 - Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria
 - Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, poliuria
- 40) Si devono infondere 500 ml di soluzione glucosata al 5% nelle 24 ore con un gocciolatore standard (20 gtt=1 ml). La fleboclisi verrà infusa alla seguente velocità:
- 21 gtt al minuto
 - 7 gtt al minuto
 - 14 gtt al minuto
 - 9 gtt al minuto
- 41) L'iperpotassiemia all'ECG si manifesta con:
- Scomparsa dell'onda T e tachiaritmie
 - Onde Q profonde e comparsa di onda U
 - Onde T appiattite e aritmie ipercinetiche
 - Onde T aguzze e aritmie ipocinetiche
- 42) In mancanza di ossigeno, dopo quanti minuti le cellule nervose di un individuo muoiono?
- Circa 1-2
 - Circa 4-5
 - Circa 8-9
 - Circa 10-11
- 43) Nell'atto deglutitorio la fase volontaria è quella:
- Orale
 - Faringea
 - Laringea
 - Esofagea
- 44) Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto:
- Sospendere la somministrazione di ossigeno
 - Aspirare per almeno 30 secondi
 - Aspirare durante l'introduzione della sonda
 - Aspirare durante la rimozione della sonda
- 45) La tecnica di iniezione intradermica prevede che l'angolo di introduzione dell'ago sia pari a:
- Circa 75°
 - Circa 30°
 - Circa 45°
 - Circa 10°-15°
- 46) In corso di somministrazione di ossigeno terapia per flussi superiori a 4-6 lt/min quale liquido deve essere introdotto nei serbatoi per l'umidificazione dell'ossigeno erogato:
- Soluzione fisiologica sterile
 - Acqua di rubinetto
 - Acqua demineralizzata sterile
 - Non serve umidificare l'ossigeno erogato

- 47) Quale, tra i seguenti, è un sintomo dell'ipocalcemia?
- Diarrea
 - Stipsi
 - Parestesia
 - Ridotta funzionalità respiratoria
- 48) Le maggiori complicanze della nutrizione parenterale sono:
- Infettive
 - Scompensative- elettrolitiche
 - Emorragiche
 - Trombotiche
- 49) Cos'è, in parole semplici, l'aprassia?
- Incapacità di svolgere azioni finalizzate a raggiungere uno scopo, in assenza di danno motorio
 - Incapacità di riconoscere persone ed oggetti, in assenza di danno motorio
 - Incapacità di ricordare fatti del passato
 - Incapacità di capire a che cosa servono determinati oggetti
- 50) Il respiro caratterizzato da cicli regolari di frequenza e profondità aumentate, senza interruzioni o periodi di apnea è il respiro:
- Di Cheyne-Stokes
 - Di Kussmaul
 - Di Biot
 - Eupnoico
- 51) Quali tra le seguenti istruzioni possono essere fornite alla persona in trattamento TAO (terapia anticoagulante orale) rispetto alla dieta da seguire?
- Eliminare gli alimenti contenenti vitamina K in particolare le verdure a foglia verde, assumere warfarin quotidianamente ½ ora prima dei pasti
 - Mantenere costante la qualità/quantità di verdure a foglia verde, assumere warfarin al mattino durante la colazione
 - Mantenere costante la qualità/quantità di verdure a foglia verde, assumere warfarin quotidianamente lontano dai pasti
 - Aumentare l'apporto di vegetali ricchi di vitamina k, assumere warfarin alla sera prima di coricarsi
- 52) In 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 g di cloruro di sodio; quanti millilitri di soluzione bisogna somministrare per fornire 3,6 g di cloruro di sodio?
- 2500 ml
 - 400 ml
 - 550 ml
 - 300 ml
- 53) La dispnea che compare assumendo la posizione supina è detta:
- Tachipnea
 - Ortopnea
 - Dispnea parossistica
 - Dispnea ipostatica
- 54) La cosiddetta "guarigione per terza intenzione":
- Riguarda ferite con bordi non prontamente approssimati
 - Implica ritardo di rimarginazione della ferita
 - Comporta tessuto di granulazione non visibile
 - Non può riguardare mai chiusure primarie

- 55) Indicare quale violazione commette l'operatore sanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica:
- Rivelazione di segreto professionale
 - Abuso d'ufficio
 - Falso materiale
 - Violenza privata
- 56) A quale delle seguenti infusioni non deve e non può essere aggiunto alcun tipo di farmaco o additivo?
- Aminoacidi
 - Emulsione di grassi
 - Bicarbonato di sodio
 - Soluzione glucosata
- 57) Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?
- Ridurre la durata della malattia
 - Ridurre l'incidenza della malattia
 - Evitare la malattia
 - Ridurre l'entità dei danni causati dalla malattia
- 58) Secondo Meleis, gli stadi di sviluppo dell'infermieristica sono, nell'ordine:
- Pratica, ricerca, formazione e organizzazione, teoria, filosofia
 - Pratica, formazione e organizzazione, ricerca, teoria, filosofia
 - Ricerca, pratica, formazione e organizzazione, teoria, filosofia
 - Pratica, formazione e organizzazione, teoria, ricerca, filosofia
- 59) La Legge 19 febbraio 2004, n.40 definisce:
- Le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
 - Le norme in materia di procreazione medicalmente assistita
 - Le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali
 - L'ordinamento didattico della laurea specialistica
- 60) Nella valutazione del paziente a rischio di confusione mentale acuta, è consigliato in letteratura l'applicazione del MMSE (Mini Mental State Examination) all'ingresso del paziente:
- per valutare il rischio di cadute in base al grado di confusione
 - perché esiste una correlazione significativa tra stato cognitivo e confusione mentale
 - per poter prevedere l'andamento dello stato cognitivo nel tempo
 - per decidere il tipo di contenzione da attuare

N. risposte esatte: _____/60

Tot.punti prova: _____/30